

РІШЕННЯ: ВІТА-МУЛЬТІ ВІТА СТРЕС ПЛЮС

ВІТА-МУЛЬТІ ВІТА СТРЕС ПЛЮС — це підсилюючий тонік на основі вітамінів та амінокислот. З огляду на різноманітні наслідки нестачі вітамінів і амінокислот, споживання корму у більшості випадків є недостатнім. Однак навіть при низькому споживанні корму тварини продовжують пити воду. Застосування нашого тоніка через питну воду дозволяє компенсувати потребу у вітамінах та амінокислотах, забезпечуючи підтримку здоров'я та продуктивності тварин.

Активні компоненти	Функція
Вітаміни	• Необхідні для метаболізму. • Забезпечують нормальне функціонування організму: ріст і розвиток, життєві функції, здоров'я та репродукцію.
Амінокислоти	• Основні елементи формування білків у всіх життєвих процесах на клітинному рівні. • Будівельний матеріал для білків. • Необхідні для підтримки життєдіяльності, росту та розмноження всього організму.

СКЛАД

Вітамін А	45 000 000 IU
Вітамін Д3	10 000 000 IU
Вітамін Е	3 250 мг/л
Вітамін К3	1 000 мг/л
Вітамін В1	2 000 мг/л
Вітамін В2	550 мг/л
Вітамін В6	1 250 мг/л
Біотин	15 мг/л
Фолієва кислота	25 мг/л
Пантотенова кислота	4 000 мг/л
Вітамін С	3 500 мг/л
Лізін	3 168 мг/л
Метионін	6 000 мг/л
Триптофан	20 мг/л
Треонін	90 мг/л
Ізолейцин	90 мг/л
Цистин	10 мг/л
Аргінін	500 мг/л
Лейцин	320 мг/л
Валін	260 мг/л
Гістидин	78 мг/л
Фенілаланін	200 мг/л
Тирозин	60 мг/л
Глутамінова кислота	1 100 мг/л
Аспарагінова кислота	200 мг/л
Пролін	1 650 мг/л
Серин	100 мг/л
Аланін	1 000 мг/л

ДОЗУВАННЯ

Птиця: 100 мл на 1000л питної води
Свині: 100 мл на 1000л питної води
ВРХ: 200 мл на 1000л питної води
ДРХ: 100 мл на 1000л питної води

ТЕРМІН ВИКОРИСТАННЯ

2 роки

ПАКУВАННЯ

250 мл чи 1 л пляшка – 5л, 20 л або 200 л бочки



ВІТА-МУЛЬТІ ВІТА
СТРЕС ПЛЮС

Максимальна продуктивність



Дистриб'ютор в Україні
www.agroplusinvest.com





Максимальна продуктивність

Вітаміни та амінокислоти відіграють важливу роль у загальному добробуті кожної сільськогосподарської тварини. Нестача вітамінів і амінокислот призводить до захворювань і втрат у рості та відтворенні. Дефіцит життєво важливих поживних речовин має дві основні причини: або ці речовини відсутні в кормі, який споживає тварина, або ж у самої тварини є фізіологічні порушення, які не дозволяють повноцінно засвоювати наявні у кормі речовини. Це явище відоме як метаболічне захворювання.

Баланс поживних речовин також має велике значення. Багато вітамінів, мінералів та амінокислот є попередниками, необхідними для синтезу інших речовин. Нестача вітамінів та амінокислот призводить до метаболічних захворювань, а також негативно впливає на ріст і продуктивність.

Хвороби, спричинені нестачею необхідних речовин у ПТИЦІ



ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛИ	↔	ДЕФІЦИТНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ
Вітамін А (Ретинол)		Харчова група
Вітамін Д (Ергостерол)		Рахіт
Вітамін Е (Альфа токоферол)		Енцефаломаліяція (хвороба "божевільних" курчат)
Вітамін К (Менадїон)		Підшкірна геморагічна пляма
Вітамін В1 (Тиамін)		Поліневрит (позиція "споглядання зірок")
Вітамін В2 (Рибофлавін)		Параліч зігнутих пальців, Деформація пуху
Вітамін В3 (Пантотенова кислота)		Дерматит курчат
Вітамін В6 (Піридоксин)		Гіперзбудливість
Вітамін В12 (Ціанокобаламін)		Перніціозна анемія
FН4 (Фоласин)		Макроцитарна анемія
Біотин		Потріскані лапи
Хлорид натрія (NaCl)		Канібалізм
Холін і Магній		Перозис (вивих сухожилля)

Хвороби, спричинені нестачею необхідних речовин у СВИНЕЙ




Дефіцит вітаміну А призводить до порушень зору та ураження епітеліальних тканин дихальної, репродуктивної, нервової, сечової та травної систем. Ознаки дефіциту вітаміну D включають рахіт, скутість, слабкі та викривлені кістки, а також параліч задніх кінцівок. Дефіцит вітаміну Е може спричинити погану репродукцію та ослаблення імунної системи. У поросят із дефіцитом вітаміну К спостерігається подовжений час згортання крові, через що вони можуть загинути від крововиливів. Деякі компоненти у запліснявілому кормі можуть перешкоджати синтезу вітаміну К. Репродуктивна функція у свиноматок може бути порушена через дефіцит рибофлавіну: тварини не входять у цикл, але інших клінічних ознак не проявляють.

Дефіцит ніацину у свиней викликає запальні ураження травного тракту, пронос, втрату ваги, шорсткість шкіри та покриву, а також дерматит в області вух. Дефіцит холіну призводить до порушень координації рухів і аномальної будови плеча. При розтині тварин часто виявляють жирові печінки та пошкодження нирок. У свиноматок із дефіцитом холіну зменшується розмір приплоду, а новонароджені поросята можуть мати розведені ноги (спрей-легс). Дефіцит біотину проявляється надмірним випадінням волосся, виразками шкіри та дерматитом, виділеннями навколо очей, запаленням слизових оболонок рота, поперечними тріщинами копит, а також тріщинами або кровотечами на подушечках ніг.

Нестача амінокислот у раціоні

Коли тваринам згодовують корм, у якому бракує хоча б однієї необхідної амінокислоти, організм не може ефективно використовувати інші амінокислоти для росту та метаболічних процесів. (рисунок 1)



МЕТАБОЛІЧНІ ХВОРОБИ



Основні чинники, що призводять до метаболічних захворювань у тварин, часто пов'язані з різними стресовими факторами, які викликають порушення всмоктування поживних речовин або втрату апетиту. У птахів метаболічні захворювання в основному вражають дві системи організму: серцево-судинну та опорно-рухову системи. **Стресові фактори у птиці:** Перші дні після вилуплення, вакцинація, транспортування, зміна раціону та тепловий стрес. **Стресові фактори у свиней:** Відлучка, транспорт, зміна раціону, вакцинація або інші ветеринарні процедури та перегрупування.